

Ny kløvergræsmark i august

August er et godt og sikkert tidspunkt for etablering af en ny kløvergræsmark. Sås det nye udlæg i første halvdel af august, giver det størst sikkerhed for et højt udbytte og en høj kløverandel, der øger proteinudbyttet fra marken.

Udbyttegevinsten i 1. slæt 2021 ved etablering primo august er omkring 1.000 FEN pr. hektar sammenlignet med såning omkring 1. september.

Bliver det nye udlæg for kraftigt inden vinter, kan det med fordel pudses af omkring 1. oktober. Alternativt kan det græsses af enten med får eller kvier indtil 15. oktober. Fordelene ved en afpudsning/afgræsning er flere sideskud pr. græsplante og dermed en tættere mark. Samtidig får kløveren mere lys og har nemmere ved at

klare konkurrencen fra græsset. Det er vigtigt, at få kvier og får af marken inden den trædes op eller bliver græsset for hårdt i bund, da det ellers går ud over udbyttet i første slæt 2021.

Alm. rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen og hybridrajgræs er hurtig til at etablere sig, så de kan sås længere hen i august. Etablering af strandsvingel PLUS og strandsvingel først i august giver det bedste resultat, da de er langsomme til at etablere sig.

Vinterhvede er den mest velegnede art som dæksæd, fordi vinterhvedens udvikling passer godt med det forventede slættidspunkt for første slæt i maj 2021. Samtidig er der næsten ingen genvækst af vinterhvede efter første slæt.

SENESTE TIDSPUNKT FOR OPTIMAL ETABLERING AF NY KLØVERGRÆSMARK

GRÆSBLANDING	PRIMÆR GRÆSART I BLANDING	JORDTYPE	
		AGER	HUMUS
ForageMax 36, 49 og 50	Med stor andel af strandsvingel SWEETY/TOWER	8. aug.	1. aug.
ForageMax 45 og 46	Med Rajgræs PLUS Rajsvingel af rajgræstypen HOSTYN, PERSEUS OG LOFA	15. aug.	8. aug.
ForageMax 40 og 41	Med Strandsvingel PLUS - HIPAST/FOJTAN	15. aug.	8. aug.
ForageMax 21-26, 32-35, og 42-43	Med almindelig rajgræs og/eller hybridrajgræs F.eks. ABOSAN 1, OVAMBO 1, BOVINII og LAMPARD	15. aug.	8. aug.

Udsædsmængden i kløvergræs skal være 30-35 kg/ha for at opnå en tæt mark og et højt udbytte. Ved såning sidst i august eller først i september kan udlægget beskyttes med vinterhvede som dæksæd.

Vi elsker græs!

På grund af den lange vækstsæson der starter i det tidlige forår og varer til det sene efterår, optager græs CO₂ over en længere periode end nogen anden afgrøde.

