

7. november 2023

Reglone i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 11, 2023

- **Reglone har fået dispensation til anvendelse i engrapgræs**
- **Reglone må anvendes i engrapgræs med 0,75 l pr. ha i vinteren 2023/2024**
- **Reglone kan kun indkøbes med "Tro og Love Erklæring"**
- **Overhold afstandskrav til offentlig vej m.m.**

Reglone må anvendes i engrapgræs fra den 15. november 2023 til den 14. marts 2024. Der må anvendes 0,75 l Reglone pr. ha med tilsætning af 0,1 l sprede-klæbemiddel pr. 100 liter vand, og der må maksimalt anvendes 75 l vand pr. ha. Læs [Tro og Love Erklæringen](#), der skal udfyldes og afleveres til forhandleren.

Det regnfulde efterårsvejr giver græsukrudtet gode fremspirings- og vækstforhold. Specielt enårig rapgræs og væselhale forekommer i stort omfang mange steder, ligesom der i de vintersædsudlagte engrapgræsmarker, er mange spildkornsplanter. Mange marker har derfor behov for at blive behandlet med Reglone i den kommende tid enten i dele af marken eller i hele marken.

Det bedste behandlingstidspunkt i engrapgræs er fra midt i december til midt i januar med udsigt til vintervejr.

Det er vigtigt at få bekæmpet enårig rapgræs og alm. rapgræs, da disse arter ikke kan frarenses. Effekten overfor hejrearter, væselhale og spildplanter er også vigtig. 0,75 l Reglone pr. ha er i den lave ende, men meget bedre end ingen Reglone, så sprøjt på en solskinsdag op til en frostperiode for at opnå den bedste effekt. Er der i efteråret startet op med andre græsukrudtsmidler, kan den lille dosering Reglone ofte være det sidste der skal til, for at fjerne uønsket græsukrudt.

Risiko for skade af Reglone i engrapgræs

Der er ingen risiko for skade på engrapgræsset, ved at anvende 0,75 l Reglone pr. ha i engrapgræs.

Virkningsbetingelser for Reglone

Den bedste effekt af Reglone opnås ved behandling om formiddagen i klart og solrigt vejr, og vigtigst med en efterfølgende frost/vinterperiode. Rim på bladene vil nedsætte effekten, så vent med at behandle til rimmen er væk. Reglone er regnfast efter få minutter, og svidningseffekten indtræffer 10 minutter efter behandlingen.

Ved temperaturer omkring frysepunktet på behandlingstidspunktet kan man tilsætte 10–12 pct. flydende gødning til sprøjtevæsken for at forebygge isdannelse i dyserne. I så fald undlades sprede-klæbemiddel.

Effekten af Reglone kan ses på planterne efter 1–3 uger afhængigt af vejrforholdene, hurtigst når Reglone-behandlingen sker på en solrig dag.

Afstandsregler

Reglone må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende, og må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Det er ofte på disse arealer, vi ser den største forekomst af græsukrudt i engrapgræsmarkerne, så måske skulle der slet ikke dyrkes engrapgræs på de yderste 10 – 12 meter ud til forureningskilderne! Læs i øvrigt her [Dokumentskabelonen](#) omkring vilkårene for sprøjteteknik ved anvendelse af Reglone og læs etiketteteksten på dunken. Dokumentskabelonen skal udfyldes og opbevares sammen sprøjtejournalen.

Kvalitetsfradrag for indhold af andre rapgræsser

Indhold af andre rapgræsser i engrapgræs er stærkt kvalitetsforringende. Der trækkes 5 pct. af afregningsprisen ved indhold af andre rapgræsser på 0,2–0,5 pct. og 10 pct. ved indhold over 0,5 pct.

Svært forurenede arealer eller del-arealer af engrapgræs bør ompløjes, fremfor at forsøge at gøre arealet rent.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF