

Spildkorn, skadedyr og gødskning i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 10, 2023

- **Spildkornsbekæmpelse i frømarken**
- **Skadedyr**
- **Gødskning af rødsvingel**

I mange 1. årsmarker er spildkorn allerede bekæmpet. I de 1. års marker, hvor behandlingen endnu ikke er udført og spildkornsplanterne hæmmer afgrøden bør behandlingen udføres snarest. Vårbyg er lettest og rug er sværest at bekæmpe. Der er lavere tolerance for spildkornsplanter af vintersæd end af vårsæd. Spildkorn og ukrudtsgræs, bortset fra enårig rapgræs og væselhale, bekæmpes med op til 1,2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash eller 0,6 l Agil pr. ha + sprede-klæbemiddel. Agerrævehale og rajgræs bekæmpes allerede i efteråret med 1,5 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha. **Marker med agerrævehale eller ital. rajgræs, der er resistent over for Focus Ultra, skal ompløjes.**

Focus Ultra må kun bruges én gang pr. vækstsæson. Derfor vil Agil efterår og Focus Ultra forår ofte være en god kombination.

I forrige [FrøavlsINFO](#) omtalte vi [Mateno Duo](#), hvormed der opnås effekt på væselhale. I de seneste uger har vi set stor fremspiring af væselhale, så tjek om det er nu, midlet skal anvendes, evt. i kombination med Boxer. Mateno Duo må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Skadedyr - hold øje med rødsvingelmarken

Skadedyrsangreb kan være årsagen til at rødsvinglen ikke gror ordentlig til i områder.

I ældre marker af rødsvingel kan insektlarver i stort antal beskadige planterne. Larver af græsmøl og løvsnudebiller gnaver på rødderne og forårsager, at græsset i pletter mistrives og går ud.

Ved kraftig angreb af græsmøl bør arealet ompløjes og efterfølges af en bredbladet afgrøde til foråret. Er løvsnudebillerne problemet kan man så vintersæd efter den 1. oktober med et godt resultat.

I de senere år har vi visse steder set kraftige angreb af aksløberens larve i specielt 1. års afgrøder. Lamdex er i dag eneste godkendte middel. Der må anvendes 0,4 l Lamdex pr. ha og brug 250 – 300 l vand/ha, effekten må forventes at være begrænset.

Sidste afpudsning

Sidste afpudsning foretages normalt medio oktober i 6 - 8 cm's højde. Der må ikke være mere materiale, end det kan forsvinde ned mellem planterne og omsættes inden vinteren. Er der for meget materiale, er det nødvendigt at rive det sammen og fjerne det.

Gødning

Normalt gødes rødsvingel efter sidste afpudsning fra omkring 10. oktober. Der gødes med 65 – 70 kg N pr. ha. Ved udlæg i ærter eller hvidkløver nedsættes mængden til ca. 50 kg N pr. ha.

Ved normale fosfor- og kalital anvendes ren kvælstofgødning. Ved meget lave tal kan med fordel anvendes NPK-gødning. Svovl behøver man ikke at tilføje om efteråret. Kvælstofnormen til rødsvingel høst 2023/24 er 150 kg N pr. ha (på nær JB 11, 100 kg N pr. ha).

Gylle kan anvendes når fordelingen er præcis og det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Der kan regnes med 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammoniumkvælstof, under forudsætning af "godt udbringningsvejr".

Husk at gyllen skal være udbragt inden 15. oktober i frøgræsmarker.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF