

BLOMSTERBLANDI NG TIL LAR

- Arter med høj fugttolerance
- Arter med høj tørketolerance
- Flerårige blomster med god konkurrencekraft



Flerårige blomster til LAR

Blandingen indeholder udelukkende flerårige arter, som har en god konkurrencekraft under fugtige forhold. Arter som blodrød storkenæb, akeleje og dagpragtstjerne tåler samtidig tørre forhold i et vist omfang.

Såtidspunkt:

april-maj og august-september

Udsædsmængde:

1,5 kg pr. 1000 m²

For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med [Rehofix majscolbegranulat](#).

Plantehøjde:

50-60 cm

Blomstring:

marts-oktober

Pleje:

Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring - dog senest d. 1. marts. Afklippet skal fjernes.

Indhold:

Flerårige: ; Hjortetrøst, *Eupatorium cannabinum*; Fredløs, *Lysimachia*; Iris, *Iris sibirica*; Aksærenpris, *Veronica spicata*;

Dagpragtstjerne, *Silene dioica**; Alm. mjøddurt, *Filipendula ulmaria*; Kattehale, *Lythrum salicaria*; Akeleje, *Aquilegia vulgaris**; Engstorkenæb, *Geranium pratense**; Trævlekrone, *Lychnis flos cuculi*; Hulkravet kodriver, *Primula veris*; Blodrød storkenæb, *Geranium sanguineum**; Engkarse, *Cardamine pratensis*; Skov-forglemmigej, *Myosotis alpestris**; Alm. Sæbeurt, *Saponaria officinalis*; Hvid Snerre, *Galium mollugo*; Gul Iris, *Iris pseudacorus*; Alm. vinterkarse, *Barbarea vulgaris*

*Arter der også er tålsomme overfor tørre forhold

Pakningsstr.: 250 g

Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand.

Vi anbefaler *ikke* at blande blomsterfrø med græsfrø. Gør man det alligevel, er det vigtigt kun at bruge tueddannende græsser og at andelen af græsfrø aldrig overstiger 40%. [Pryd- og natur-græsblanding](#) er mest velegnet til det formål. Sås der blomsterfrø i et tyndt bevokset græsareal, anbefaler vi også at så [Liden skjaller](#) for at holde græsset i ave.

Særligt for produktet

- Lokal afledning af regnvand